

Bildbilaga till "Ortolansparv – kunskapsläge och praktiska åtgärder för förbättring av häckningshabitatet"



1 Fält med vattenskadad höstsäd i förgrunden och häckbiotop i bakgrunden.
Kvismaren, Söröslätten 2011.

Foto Jan Sondell



2. Nyrensat öppet dike, kan utgöra ortolanbiotop i 1-2 år. Foto Maskinisten.net



3. Markberett hygge utanför Umeå med körskador.

Foto Gunnar Selstam



4. Mager jordbruksmark, sandjord med gles gröda och med hållmarker i närheten.
Västmanland.

Foto Jan Sondell



5. Orörd grusås med naturligt öppen jord. I bakgrunden flack jordbruksmark med partier av öppen jord, Sofiebergsåsen, Södermanland *Foto Jan Sondell*



6. Energiskog saknar ofta markvegetation. Kvismaren 2008. *Foto Jan Sondell*



7. Skogsbrandfält vid Bodträskfors, Norrbottens län, 1500 hektar, brann 2006, foto från 2011. Minst 20 revir av ortolansparv bedömdes finnas. *Foto Anders Enetjärn*



8. Vegetationslöst markskikt i björkskog med underväxt av druvfläderbuskar, Restamossen, Kvismaren 2011 *Foto Jan Sondell*



9. Videbuskar dödade med herbicider, Vallentuna 2012

Foto Jan Sondell



10. Ortolanrevir längs den nybyggda Botniabanan.

Foto Gunnar Selstam